

8. Каковы признаки заболевания туберкулезом у детей

Диагностировать туберкулез сложно, он часто прячется под масками других болезней - ОРВИ, ангины, бронхита.

Родителям следует насторожиться, если у ребенка:

- длительный кашель (более трех недель), иногда с мокротой и кровью
- боль в груди, одышка
- слабость, снижение аппетита, потеря веса
- беспричинное повышение температуры (37,0-37,3)
- ночная потливость
- увеличены лимфатические узлы

9. Как лечат туберкулез у детей

Лечение туберкулеза у детей такое же, как у взрослых. Главный компонент - химиотерапия специальными противотуберкулезными препаратами (обычные антибиотики в отношении туберкулеза бессильны). Назначить схему терапии может только врач-фтизиатр. Большинство детей хорошо переносят лечение туберкулеза, их организм более восприимчив к лекарственным средствам. Курс терапии длится, как правило, от 6 до 12 месяцев. Если соблюдать все предписания врача, наступает полное выздоровление. Несоблюдение назначенной схемы лечения, прерывание терапии могут привести к формированию лекарственно-устойчивой формы туберкулеза у ребенка. В этом случае потребуется более длительное и сложное лечение.



Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Журавушка»



Как защитить детей от туберкулеза



Информация подготовлена
медицинской сестрой
ОДРиРПСМР «СДВ» Агеенко А.В.

Наши контакты:

Российская Федерация, 628383, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г.
Пыть-Ях, микрорайон 4 «Молодежный», дом 3
Телефон: 8(3463)46-00-26
Факс: (3463)46-06-25
E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru
Сайт: <http://www.zhuravushka86.ru>

г. Пыть-Ях
2018 год

В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется неблагоприятная ситуация по туберкулезу. Безусловно, все мамы и папы обеспокоены тем, как уберечь своих детей от опасной инфекции. Мы надеемся, что эта информация поможет сохранить здоровье и жизнь каждого ребенка.

1. Где и как ребенок может заразиться туберкулезом

Туберкулез передается от человека человеку по воздуху: при кашле, чихании или отхаркивании люди, болеющие легочным туберкулезом, выделяют в воздух микобактерии. Для инфицирования здоровому ребенку достаточно вдохнуть незначительное количество таких микобактерий. Причем, дети с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, плохо питающиеся имеют более высокий риск заболеть туберкулезом.

2. Для чего делается прививка БЦЖ

Врожденного иммунитета к туберкулезу не существует. Поэтому в первые дни после рождения здоровым малышам делается прививка противотуберкулезной вакциной БЦЖ. Она обеспечивает защиту детей раннего возраста от самых опасных форм заболевания, в частности - туберкулезного менингита. Иммунитет, приобретенный после прививки БЦЖ, сохраняется в среднем 5 лет. Для поддержания иммунитета к туберкулезу проводятся повторные вакцинации в 7 и 14 лет.

Перед вакцинацией обсудите это с педиатром: прививка БЦЖ делается только

детям, у которых нет противопоказаний.

3. Что такое реакция Манту и Диаскинтест

Реакция Манту - это диагностический тест для обследования детей на туберкулез с использованием специального препарата (туберкулина). Если ребенок уже «встретился» с микобактериями туберкулеза (инфицирование или прививка БЦЖ), организм отвечает на пробу Манту определенной реакцией: в месте введения туберкулина возникает воспаление (папула). Для этой же цели, а также для контроля за противотуберкулезным лечением используется новый внутрикожный диагностический тест - Диаскинтест. Он проводится и оценивается так же, как проба Манту с туберкулином. Сама по себе положительная реакция Манту не является 100% доказательством, что ребенок болен туберкулезом. Для подтверждения диагноза проводят рентген грудной клетки, микробиологический посев мокроты и еще ряд исследований.

4. Как должен вести себя в семье больной туберкулезом, чтобы не заразить детей

Когда в доме есть больной туберкулезом, его верхнюю одежду и постельные принадлежности нужно чаще проглаживать горячим утюгом, выносить на солнце, проветривать, сушить и чистить, а также периодически обрабатывать в дезинфекционной камере. Больной человек должен пользоваться отдельной посудой.

Лучше всего на время лечения исключить контакты детей с больным туберкулезом, даже если это мама или папа.

5. Что такое профилактическое лечение туберкулеза

Если у ребенка был контакт с кем-то из больных туберкулезом, важно своевременно провести ему профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами (химиопрофилактику). Это позволит не допустить развития заболевания.

6. Почему необходимо изолировать ребенка из очага туберкулеза

Проживание в одном доме с человеком, который болен туберкулезом и является бактериовыделителем, опасно для ребенка. Врачи всегда предлагают изолировать детей и подростков из очага инфекции на срок от 3 до 6 месяцев.

7. В каких случаях нужно обследовать детей на туберкулез

- Когда в семье есть больной туберкулезом

- Когда больной туберкулезом человек живет по соседству, и возможен контакт ребенка с ним

- Когда сам ребенок длительное время (больше трех недель) кашляет

- Когда у ребенка положительная туберкулиновая проба